

1000 Continental Drive, Suite 240 | King of Prussia, PA 19406, EE. UU.
610.989.8080 | tricemedical.com

4-10-0088 Rev. A

Español

mi-eye 2™

INSTRUCCIONES DE CUIDADOS

La respuesta para una recuperación más rápida

Al elegir mi-eye 2™, ha dado el primer paso para volver a su vida activa más rápido que al elegir una RM*. Con la ayuda de mi-eye 2™, usted y su médico ahora pueden tomar la decisión sobre cuál es el mejor tratamiento para SU afección en particular.

¿Qué hacer ahora?
Después del procedimiento mi-eye, deberá cuidar el lugar del procedimiento, ya que se trata de una herida abierta. También es posible que presente malestar, dolor y secreción en el lugar del procedimiento. Todo esto es normal.

Para asegurarse de que cicatrice de forma adecuada, siga las instrucciones de cuidados y cualquier instrucción especial de su médico.

Siga a Trice Medical en las redes sociales y comparta su experiencia con mi-eye 2™.

@tricemedical

**En función del período estimado para las pruebas de radiología y sus resultados, incluidas las consultas de seguimiento.*

Instrucciones de cuidados

Si presenta molestias o dolor después del procedimiento, una vez que desaparezca el efecto de la anestesia local, siga primero la técnica **RICE: R**est (descanso), **I**ce (hielo), **C**ompression (compresión) y **E**levation (elevación). Si el dolor sigue sin desaparecer, puede tomar medicamentos antiinflamatorios de venta sin receta, como un AINE (ibuprofeno, aspirina, etc.) o acetaminofeno (paracetamol) de acuerdo a las instrucciones incluidas en la información del fármaco. Asegúrese de seguir las recomendaciones del médico para manejar de forma adecuada el dolor en el hogar, lo que incluye qué medicamento es mejor para usted. Si tiene escalofríos, fiebre o sensación de calor en el lugar del procedimiento, o cualquier otro efecto adverso, comuníquese con su médico lo más pronto posible.

Vendaje
Antes de que se retirara del consultorio del médico, le colocaron un vendaje sobre el lugar del procedimiento mi-eye. Cualquier sangrando que se produzca después del procedimiento debería resolverse rápido. Al día siguiente al procedimiento, puede dejar el lugar de la herida sin tapar, si así se lo indica el médico. Si se observa secreción continua de la herida, puede volver a aplicar un vendaje sobre el lugar. Comuníquese con su médico si la secreción parece anormal o excesiva.

Vuelta a la actividad
A menos que presente síntomas que perduren, puede reanudar sus actividades después del procedimiento mi-eye. Asegúrese de seguir todas las recomendaciones de restricción de las actividades que le haya hecho el médico.

Qué no debe hacer
Es recomendable que evite sumergir la zona hasta que haya cicatrizado por completo para evitar una posible infección. Durante un período de tiempo, según le indique el médico, debe evitar lo siguiente:

- Bañeras
- Jacuzzi
- Nadar (piscina, lago, río, océano, etc.)

mi-eye 2™ se utiliza en procedimientos endoscópicos y artroscópicos quirúrgicos y de diagnóstico para proporcionar iluminación y visualización de una cavidad interna del cuerpo a través de una abertura natural o quirúrgica, y está disponible solamente para uso con receta. Hable con su médico para obtener más información sobre mi-eye 2™.